２４０７０－１３０５

令和４年９月２０日

保護者の皆様へ

宮崎県福祉保健部長

（ 公 印 省 略 ）

新型コロナワクチン接種の積極的な検討について（お願い）

本県の新型コロナウイルス感染症対策については、日頃から御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

現在、県内では、子どもを含む若い世代を発端に家庭内で感染が広がるといった感染状況がみられています。

また、令和４年９月６日から、５歳から１１歳の小児への新型コロナワクチン接種が「努力義務」に位置づけられるとともに、３回目接種も開始されました。

つきましては、別紙を参照いただき、ワクチン接種の効果や副反応などについて、御理解いただき、御家庭での積極的な検討をよろしくお願いいたします。

（文書取扱　薬務対策課）

担当　　ワクチン確保・調整担当
直通　　０９８５－２６－３１４１
e-mail　miyazaki-wakuchin@pref.miyazaki.lg.jp

（別紙）

Q1 新型コロナワクチンってどういうもの？

令和４年９月６日から２回目完了から５か月経過した人は、３回目接種を受けることができます。

ワクチンの種類　ファイザー社ワクチン（5～11歳用）

接種量　１回 0.2ml　３週間あけて２回　　**対象**　５～11歳の子ども

保護者の方へ

ファイザー社の12歳以上のものと比べ有効成分が1/3になっています。ワクチンの有効成分であるmRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、mRNAは人の遺伝情報（DNA）に組み込まれるものではありません。こうしたことから、mRNAを注射することで、その情報が身体の中に長期に残ったり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えられています。

出典：厚生労働省「新型コロナワクチン Q&A」より

Q2 新型コロナワクチンの効果って？

オミクロン株に対しても、入院予防効果が約８割と報告されています。（２回目接種後60日まで）

ワクチンを受けると体の中でコロナと戦うしくみができて、感染してもコロナの症状が出にくくなったり、症状が重くなりにくくなります。

保護者の方へ

オミクロン株が出現する前のデータになりますが、５～11歳における２回目接種後７日以降の発症予防効果は90.7％と報告されています。また、接種後に感染した場合でも発症を予防することで、療養期間を短縮することが期待できます。

出典：コミナティ筋注適正使用ガイド

Q3 新型コロナワクチンは安全なの？

副反応は、12～17歳より軽い傾向があります。
※12～17歳は、若年青年と同等

ワクチンの副反応って？

ワクチンを受けると時々出る、痛みやだるさ、熱のような症状のことです。

いつ出る？

ワクチンを受けた日の夜から１～２日後に出ることが多いです。

どんな症状？

注射した部分の痛み、体のだるさ　〈50％以上〉
頭の痛み、筋肉の痛み、寒気、注射した部分の赤み・はれ　〈10～50％〉
げり、熱、関節の痛み、おうと　〈1～10％〉

出典：コミナティ筋注適正使用ガイド

こんな時は医療機関に相談
接種後２日以上経っても解熱しない
症状が重い



保護者の方へ

米国での調査によると、約870万回のワクチン接種後に軽症の心筋炎を発症した例が11例報告されていますが、いずれも回復しています。また、12～17歳男子に比べ５～11歳の男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

出典：日本小児科学会ホームページより

このようなお子様に接種をお勧めします。



慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病、慢性の腎臓病、神経の病気、血液の病気、糖尿病・代謝性の病気等基礎疾患をお持ちのお子様の場合は、新型コロナウイルス感染症により重症化のリスクが高くなると考えられています。ワクチン接種により重症化を防ぐことが期待されますので、かかりつけ医に相談してください。

詳しくはこちらのHPをご参照下さい。

日本小児科学会トップページ